

No	16												
指標名	肺血栓塞症の予防対策実施率												
定義	<p>(分子)肺血栓塞症の予防対策が実施された手術数 (分母)肺血栓塞症の発生リスクが「中」以上の手術数</p> <p>※肺血栓塞症予防対策・・・弾性ストッキング、間歇的空気圧迫装置、抗凝固薬の実施 ※リスク「中」以上の手術・・・全国自治体病院協議会から配付される対象手術リストによる</p>												
結果	<div style="text-align: right;"> ■ 当院 ■ 全国中央値 </div> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>当院 (%)</th> <th>全国中央値 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015年度</td> <td>91.2%</td> <td>90.6%</td> </tr> <tr> <td>2016年度</td> <td>90.8%</td> <td>91.1%</td> </tr> <tr> <td>2017年度</td> <td>90.0%</td> <td>91.6%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(当院)2015年度、2016年度、2017年度における当院のデータ (全国)2015年度、2016年度、2017年度に実施した病院の中央値 (2018/04/25 時点) ※他院との詳細な比較につきましては「全国自治体病院協議会 医療の質の評価・公表等推進事業」のページをご参照ください。</p>	年度	当院 (%)	全国中央値 (%)	2015年度	91.2%	90.6%	2016年度	90.8%	91.1%	2017年度	90.0%	91.6%
年度	当院 (%)	全国中央値 (%)											
2015年度	91.2%	90.6%											
2016年度	90.8%	91.1%											
2017年度	90.0%	91.6%											
コメント (解説)	<p>肺血栓塞症は、大きな手術後、ベッド上安静を長くしている場合に発症しやすいとされています。</p> <p>今回の指標では、手術のリスク分類を行い、中リスク以上の手術の前後で対策が行われている率を測定しました。対策を積極的に取り組んでいる病院は率が高くなります。</p> <p>血液凝固を抑える薬剤(抗凝固剤)を使用できない患者さんや弾性ストッキングを下肢に着用できない患者さんもありますので、このような患者さんが多い病院では率が低くなります。</p> <p>当院の値は高く、ほぼ全国中央値並みの実施率であると言えます。</p> <p>2016年に比べ、大きな変化はありません。</p>												